

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST - ECUADOR S.A.**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero Ciudad Millenium, Edificio Platinum I. Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador
Teléfono: (04) 6061360**Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá. Quito - Ecuador.
Teléfono: (02) 6016686

FORMULADOR:

FORMULADO POR: ZHEJIANG HETIAN CHEMICAL CO., LTD.No. 387 TainMuShan, Hangzhou Zhejiang, China 310023
Teléfono: +86-571-85224541

CLASE:

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

194-F6/NA-CL1

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

150 mL, 200 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 25 L, 200 L

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO
PELIGRO

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo:		
	Fluazinam.....500 g/L		
	Aditivo de importancia toxicológica:		
	Tributyl phosphate.....4 g/L		
MODO DE ACCIÓN:	Aditivos c.s.p.....1 L		
	Contacto		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Tactic es un fungicida con leve efecto residual, que actúa en la respiración como desacoplador de la fosforilación oxidativa.		
GRUPO QUÍMICO:	Pyridine		
CÓDIGO FRAC:	Grupo 29		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	0.135 mg/l	7.5	1.72×10^{-2} mPa a 20°C
	Kow	Koc	PM
	4.87	1705 - 2316	465.14 g/mol

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymosa</i>)	Hernia de las crucíferas (<i>Plasmodiophora brassicae</i>)	4 l/ha	50 días	24 horas
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,75 ml/l	No aplica	24 horas
Banano (<i>Musa acuminata</i> AAA)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0,4 l/ha	0 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Brócoli: Realizar la aplicación en forma preventiva, antes de que se presenten los síntomas de la enfermedad, en condiciones adecuadas para el desarrollo y cuando haya antecedentes de la presencia de la plaga. Se recomienda hacer dos aplicaciones por ciclo con un intervalo de 14 días.

Rosa: Realizar la aplicación en forma preventiva, antes de que se presenten los síntomas de la enfermedad. Realizar dos aplicaciones por ciclo.

Banano: Aplicar cuando exista máximo grado 2 en la hoja 3 según la escala Preaviso Biológico. Realizar 2 aplicaciones por ciclo con un intervalo de 14 días.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Brócoli: 400 l/ha

Rosa: 1000 l/ha (Cultivo en producción)

Banano: 80 l/ha en aplicación terrestre y 20 l/ha en aplicación aérea.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Regular el pH del agua de aplicación a 6, luego verter la cantidad necesaria de Tactic al tanque conteniendo agua hasta la mitad de su capacidad. Llenar el depósito con agua y agitar el líquido hasta formar una mezcla homogénea. Adicionar coadyuvante a dosis de 0.25 ml/l agua. No aplique cuando haya amenaza de lluvia o viento fuerte. Se recomienda aplicar junto con un adherente. No debe aplicarse en contra del viento ni cuando la velocidad de éste sea mayor a 10 km/hora. No exceder dosis y volúmenes de aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Tactic es incompatible con productos de reacción alcalina o ácida. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad en caso de existir duda de compatibilidad con nuevas formulaciones.

Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para los cultivos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
COMALGRO CIA LTDA. Teléfono: (03) 2626457



V1.16-06-2026.VM