

DATOS GENERALES

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AVGUST – ECUADOR S.A.**Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador

Teléfono: (04) 6061360

Sucursal Quito: Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador.

Teléfono: (02) 6016 686

FORMULADO POR:

ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Wujiang Town, Hexian Country, Anhui 238251, China

CLASE:

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN:

Suspensión Concentrada (SC)

REGISTRO NACIONAL No.:

136-I3/NA

PRESENTACIONES AUTORIZADAS:

50 ml, 150 ml, 1l, 200 l

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4– LIGERAMENTE PELIGROSO
ATENCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	Ingrediente activo: Spinetoram.....60 g/l Aditivos c.s.p.....1 l		
MODO DE ACCIÓN:	Insecticida de acción por contacto e ingestión.		
MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa a través del receptor nicotínico, se une de manera única a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el sistema nervioso del insecto, alterando también los canales de GABA. Esto provoca una activación nerviosa continua e involuntaria que genera temblores severos, el cese inmediato de la alimentación, parálisis muscular irreversible y, finalmente, la muerte del insecto en pocas horas.		
GRUPO QUÍMICO:	Espinosinas		
CÓDIGO IRAC:	Grupo 5		
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	Solubilidad	pH	Presión vapor
	29 mg/l	5.0 - 9.0	5.7×10^{-2} mPa a 25°C
	Kow	Koc	PM
	4.2	5500 - 46000	748 g/ mol (espinosina J) + 760.1 g/mol (espinosina L)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
 "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA	PERÍODO DE REINGRESO
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.10 l/ha	7 días	24 horas

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

En el tanque de preparación vierta la dosis a utilizar de Spinet en la mitad de volumen de agua, agite bien y complete el volumen de agua requerido. Mangenta en agitación constante. No guardar la mezcla, aplique el mismo día de su preparación.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo, cubriendo de forma homogénea todo el follaje. Hacer la aplicación cuando el cultivo se encuentre en estado fenológico de desarrollo vegetativo, y un umbral económico de 2 a 3 larvas de gusano cogollero por planta.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:

Maíz: 200 l/ha

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad a pequeña escala previo a la aplicación. El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST-ECUADOR S.A. Teléfono (02) 6016686 - Quito.



V1.26-06-2026.VM