CortAG 3000®

DATOS GENERALES	
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	**AVGUST - ECUADOR S.A.** **Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Edificio Platinum I, Piso 07, Oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 **Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	**Haebaragi LLC** 141411, Federación de Rusia, Moscú, 28B Mezhdunarodnoe sh., Ed. 1, piso 3, sala 21.
CLASE:	ELICITOR
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble (SL)
REGISTRO NACIONAL No.:	F-2024-1938
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	500 ml, 1 l, 200 l
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	No aplica

INFORMACIÓN TÉCNICA		
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	**COMPOSICIÓN**	**% P/V**
	Plata coloidal (Ag)	3000 mg/l
DESCRIPCIÓN:	CortAG 3000 es un producto integral basado en plata coloidal estabilizada para la prevención en el desarrollo de enfermedades fúngicas y bacterianas. Inhibe la progresión de enfermedades, incrementa la productividad y mejora la calidad comercial de los cultivos.	

	Este producto se basa en la tecnología única, la cual se fundamenta en la estabilización de partículas coloidales de metales mediante macromoléculas de polímeros biológicamente activos. Esta innovadora técnica permite la formación de complejos supramoleculares que presentan una elevada actividad biológica tanto en la lucha contra fitopatógenos como en la estimulación del crecimiento y desarrollo de plantas superiores.
MODO DE ACCIÓN:	Activa en la planta mecanismos de defensa inducidos como respuesta al ataque de patógenos durante el proceso de infección.
GRUPO QUÍMICO:	Inorgánico

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	**Densidad**	**pH**
	1.055 +/- 0.020 g/ml	9.2 +/- 1.5
	Solubilidad:	
	Soluble	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL"

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Banano (*Musa acuminata* AAA)	0.70 – 1 l/ha	Verano, temporadas de baja incidencia de sigatoka	Aéreo-fumigación
Rosa (*Rosa* sp.)		Luego de la poda, en momentos de estrés de la planta	Aplicación con bomba de fumigación

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Banano: Realizar 2 aplicaciones con una frecuencia de 15 días.

Rosa: Realizar 2 aplicaciones con una frecuencia de 8 días.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
En el taque de aspersión o tanque auxiliar, deposite agua limpia por lo menos hasta la mitad. Luego agregue la cantidad recomendada del producto agitando la mezcla mientras efectúa la operación, después complete con agua hasta completar el volumen final. Aplique la mezcla tan pronto como sea posible evitando su almacenamiento prolongado. Use equipo adecuado y correctamente calibrado para obtener cubrimiento uniforme de las plantas.

VOLÚMENES DE MEZCLA REDOMENDADOS:
Depende de las necesidades del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Es compatible con pesticidas (excepto aquellos que contienen azufre elemental), reguladores del crecimiento de las plantas, así como con macro y microfertilizantes minerales de un solo componente y complejos (excepto aquellos que contienen etanolaminas y sus complejos). En cada caso, se requiere una evaluación previa de la compatibilidad físico-química de los componentes a mezclar. No se recomienda su uso en combinación con preparados microbiológicos.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
AVGUST - ECUADOR S.A. Teléfono: (02) 6016686 - Quito.



V1.09-07-2026.VM