DATOS GENERALES	
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:	**AVGUST - ECUADOR S.A.** **Matriz Daule:** Av. León Febres Cordero. Ciudad Millenium. Ed. Platinum I, piso 07, oficina 702. Daule – Ecuador Teléfono: (04) 6061360 **Sucursal Quito:** Av. Pampite y Simón Valenzuela, Ed. Yoo Cumbayá, Oficina 306. Cumbayá, Quito, Ecuador. Teléfono: (02) 6016 686
FORMULADO POR:	**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.** Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, China 262737
CLASE:	REGULADOR DE CRECIMIENTO
FORMULACIÓN:	Gránulos Solubles en Agua (SG)
REGISTRO NACIONAL No.:	1325-F-AGR-P
PRESENTACIONES AUTORIZADAS:	45 g, 1 kg
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:	No aplica
INFORMACIÓN TÉCNICA	
COMPOSICIÓN GARANTIZADA:	**Ingrediente activo:** Ácido Giberélico.....400 g/kg Excipientes c.s.p .....1 kg
MODO DE ACCIÓN:	Es un regulador de crecimiento que actúa por contacto, fitorregulador que estimula el crecimiento de las células.

MECANISMO DE ACCIÓN:	Actúa eliminando las proteínas DELLA, que funcionan como los "frenos" genéticos del crecimiento. Al destruir este bloqueo, la célula queda libre para producir las enzimas que ablandan y estiran su pared celular, y para sintetizar α-amilasa, la enzima encargada de convertir rápidamente las reservas de almidón en la energía necesaria para impulsar el desarrollo del tejido.	
GRUPO QUÍMICO:	Giberelinas	
CÓDIGO FRAC:	No aplica	
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS:	**Densidad**	**pH**
	-	**3.0 - 7.0**
	Solubilidad:	
	-	

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FORMA DE APLICACIÓN
Arroz (*Oriza sativa*)	5 g/ha	Macollamiento	Foliar
Tomate riñón (*Solanum lycopersicum*)	5 g/ha	Prefloración	Foliar

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Arroz: se aplica una sola vez al inicio del espigado para estirar la panícula, uniformar la floración y evitar el atrapamiento del grano.
Tomate riñón: se aplica de forma dirigida y repetida a cada racimo floral durante la apertura de sus flores para amarrar el fruto y mejorar su tamaño comercial, evitando siempre rociar el follaje general para no estirar ni debilitar los tallos de la planta.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Se debe realizar una premezcla de Rainlic en un recipiente por separado. Llenar con agua hasta la mitad de la capacidad del tanque. Agregar la premezcla y continuar agitando, colocar agua hasta completar la capacidad del tanque, sin dejar de agitar para garantizar una dilución adecuada. El equipo debe ser calibrado constantemente para asegurar una buena cobertura del cultivo con la dosis adecuada. El envase debe abrirse cuidadosamente utilizando el equipo de protección adecuado.

VOLÚMENES DE MEZCLA RECOMENDADOS:
Depende de las necesidades del cultivo donde se aplique.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:
Es incompatible con agentes oxidantes, ácidos y alcalinos. En caso de duda realizar una prueba preliminar a pequeña escala. De realizarse mezclas, éstas deberán de hacerse únicamente con productos registrados y autorizados en los cultivos indicados en la etiqueta.

No es fitotóxico para el cultivo recomendado a las dosis recomendadas bajo condiciones normales de aplicación.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366). Atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.
SINOCHEMICAL S.A. Teléfono: 092500795



V1.10-07-2026.VM